

COLOSKOPI

Coloskopi er en undersøgelse, hvor man ved hjælp af et lille videokamera monteret på en bøjelig sonde (coloskopet), kan komme rundt i tarmens bøjninger og undersøge hele tyktarmen. Mindre polypper i tarmen kan fjernes i samme undersøgelse. Der tilbydes en indsprøjtning med beroligende/smertestillende medicin lige forud for undersøgelsen. Der vil være mulighed for at hvile lidt efter undersøgelsen.

Undersøgelsen kan være lidt ubehagelig, føles mest som mavekneb, og er ikke i sig selv noget faresignal. "Maveknebene" opstår, fordi der pustes luft ind i tarmen for at få et bedre overblik, og fordi der "trækkes" lidt i tarmen, når coloskopet skal rundt om et hjørne. Disse "hjørner" eller bøjninger er forskelligt udtalt hos forskellige patienter, men undersøgeren ved på hvilke steder, de typisk opstår – der følges med ikke blot på videobilledet, men forløbet kontrolleres også på en selvstændig (magnet)skærm. Undersøgeren vil således kunne berolige undervejs. Det tilstræbes at suge så meget luft som muligt med ud igen efter afslutning af undersøgelsen.

Der vil efter undersøgelsen være mulighed for at gennemgå undersøgelsesresultater, enten umiddelbart, eller evt. til ledsager afhængig af om, der er givet beroligende medicin. Der kan også arrangeres en senere konsultation.

Undersøgelsen coloskopi er behæftet med en meget beskednen risiko for komplikationer i form af blødning eller perforation. Dette gælder i lidt højere grad, når der er udført polyp-fjernelse. Komplikationerne vil næsten altid blive diagnosticeret straks og den påkrævede behandling iværksat. Det kan dog ske at en komplikation først optræder senere og pt. skal derfor ved vedvarende eller nyopståede smerter i maven og/eller blødning fra tarmen kontakte klinikken eller, uden for dennes åbningstid, nærmeste skadestue.

Ifølge færdselsloven er det forbudt af føre motorkøretøjer (og forøvrigt også cykel) i 24 timer efter undersøgelsen.

FØR UNDERSØGELSEN

Hvis du lider af andre sygdomme, specielt vedrørende hjerte (f.eks. får blodfortyndende medicin), lunge eller nyrer skal du gøre opmærksom på det, når du aftaler tid til undersøgelsen.

FORBEREDELSE

Se vedlagte Pico-Salax vejledning (**OBS! Pico-Salax og PicoPrep er det samme præparat**)

BEMÆRK:

Det er mødetidspunktet, der er angivet. Undersøgelsen finder sædvanligvis sted inden for ½ time herefter.

UNDERSØGELSE: _____ dag, den ____/____ 2019, kl. _____